

マスタ内容確認シート

1 / 3

発行日時 2025年12月23日 08時37分

レジメンNo. 01-070087

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 オビヌツズマブ+ベネトクラクス（1コース目）

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）	day（6）	day（7）
		速度指示							
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
03	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 25mL/時（4時間で） [H] ガザイバ1000mg (100)生食注100mL 総液量 100mLに調製 フィルター付ルート	100mg /Body 100mL	未定						
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 97.2mL/時→111.1mL/時（30分毎） 55.6mL/時→69.4mL/時→83.3mL/時→ [H] ガザイバ1000mg 総液量 250mLに調製 フィルター付ルート (250) 生理食塩液250mL 13.9mL/時→27.8mL/時→41.7mL/時→	900mg /Body 250mL		未定					
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 〆ネルクスタ 20mg/日 分1 day22-28 中程度のCYP3A阻害薬を併用:〆ネルクスタ 10mg/日 day22-28 強いCYP3A阻害薬は併用禁忌 がザイハ 投与30分～1時間前にブルフェン・シタキミン内服		

マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2025年12月23日 08時37分

レジメンNo. 01-070087

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 オビヌツズマブ+ベネトクラクス（1コース目）

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
		速度指示							
02	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
05	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 100mL/時（30分毎） 25mL/時→50mL/時→75mL/時→ [H] ガザイバ1000mg (250) 生理食塩液250mL 総液量 250mLに調製 フィルター付きルート	1000mg /Body 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ベネクレスタ 20mg/日 分1 day22-28

中程度のCYP3A阻害薬を併用:ベネレクタ 10mg/日 day22-28

強いCYP3A阻害薬は併用禁忌

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2025年12月23日 08時37分

レジメンNo. 01-070087 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 オビヌツズマブ+ベネトクラクス（1コース目）

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
02	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
05	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 100mL/時（30分毎） 25mL/時→50mL/時→75mL/時→ [H] ガザイバ1000mg (250) 生理食塩液250mL 総液量 250mLに調製 フィルター付きルト	1000mg /Body 250mL	未定						
―― 終了 ――									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント ベネトクラクス 20mg/日 分1 day22-28 中程度のCYP3A阻害薬を併用:ベネトクラクス 10mg/日 day22-28 強いCYP3A阻害薬は併用禁忌 ガザイバ 投与30分～1時間前にフルフェン・レタミン内服		