

マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2026年03月10日 16時14分

レジメンNo. 01-079269

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT ALL/MRD2023 (Ph-, CD19-) 【維持療法(M-1)】 [36-55歳]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示		day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
				未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠を内服 15分で グラニセトロン注3mg/バック ガスター注20mg ボララミン注5mg	1袋 1管 1管		未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 全開で [H] オンコピン1mg (50)生理食塩液 50mL	1.3mg 50mL	/m ²	未定						
04	点滴 点滴注射 オコピン投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL		未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で [H] オンキヤスパー点滴静注用3750 (100)生食注100mL 蒸留水20mL	750単位 100mL 1管	/m ²	未定						
06	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射 (腰椎) (無菌加算) 指定の容器に入れて払出 総量6mL (10mLシリンジで調製) [H] メソトレキセート50mg [H] (3.3)デキサート3.3mg (20)生食注 20mL	15mg 3.3mg 1管	/Body	未定						
終了										

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント PSL (経口又は注射) 60mg/m ² (最大100mg/body) day1-5 MTX 20mg/m ² /週 (3-6日/週に分割し、就寝前に内服) 6-MP 40mg/m ² (就寝前に内服) day1-28 制吐薬投与時に加ナール 500mgを内服		