

マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2026年04月06日 16時45分

レジメンNo. 01-079303

クール日数 4日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT Ph ALL/MRD2025【地固め(B1)】[40-54歳]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定	未定	未定			
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定	未定	未定	未定			
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 3時間で [H] キロサイドN 1g (500)生食500mL	1000mg 500mL /m ³	未定	未定	未定	未定			
04	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射(腰椎)(無菌加算) Total 6mL(10mLロックシリンジにて調製) [H] メソトレキセート50mg [H] (3.3)デキサセート3.3mg (20)生食注 20mL	15mg 3.3mg 1管 /Body	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

アイクルック 30mg(MRD陽性)/15mg(MRD陰性) 分1 day1~内服
 フルオロトロン点眼±生食点眼を1日数回点眼(和サト 投与期間:結膜炎予防)
 フィルカラシム 150μg(皮下)/300μg(点滴) day6以降(好中球数≥5000まで)