

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-079301

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT Ph ALL/MRD2025【地固め(D1)】[45kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			未定	未定	未定	未定	未定	未定	未定
01	点滴 点滴注射 30分で [H] (6.6) デキサート6.6mg (100) 生食注100mL	3管 1瓶	未定						
02	点滴 点滴注射 フィルター付きルート 10mL/時 24時間かけて [H] ビーリンサイト注35μg 蒸留水20mL (20) 生食注 20mL (250) 生理食塩液250mL	5μg /ml 3mL 20mL 250mL	未定	未定	未定	未定	未定	未定	未定
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント MTX+DEX髄注[MTX 15mg/DEX 3.3mg](day0)は別途オーダー アイクルシカ 30mg(MRD陽性)/15mg(MRD陰性) 分1 day29~14日間以上。地固め(B1)のday-1まで 投与ルートは薬剤溶解液で満たすこと。交換時、投与終了時のフラッシュ禁止。残液は廃棄		

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2026年02月09日 14時55分

レジメンNo. 01-079301

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT Ph ALL/MRD2025【地固め(D1)】[45kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	点滴 点滴注射 30分で [H] (6.6) デキサート6.6mg (100) 生食注100mL	3管 1瓶	未定						
03	点滴 点滴注射 フィルター付きルート 10mL/時 24時間かけて [H] ビーリンサイト注35μg 蒸留水20mL (20) 生食注 20mL (250) 生理食塩液250mL	15μg /m ² 3mL 20mL 250mL	未定	未定	未定	未定	未定	未定	未定
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

MTX+DEX随注[MTX 15mg/DEX 3.3mg] (day0)は別途オナー
アikalシク 30mg (MRD陽性)/15mg (MRD陰性) 分1 day29~14日間以上。地固め(B1)のday-1まで
投与ルートは薬剤溶解液で満たすこと。交換時、投与終了時のフラッシュ禁止。残液は廃棄

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2026年02月09日 14時55分

レジメンNo. 01-079301

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT Ph ALL/MRD2025【地固め(D1)】[45kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
04	点滴 点滴注射 フィルター付きルート 10mL/時 24時間かけて [H] ビーリンサイト注 35 μ g 蒸留水20mL (20) 生食注 20mL (250) 生理食塩液250mL	15 μ g	/m ²	未定	未定	未定	未定	未定	未定	未定
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

MTX+DEX髄注[MTX 15mg/DEX 3.3mg](day0)は別途オーダー
 アイクルック 30mg(MRD陽性)/15mg(MRD陰性) 分1 day29~14日間以上。地固め(B1)のday-1まで
 投与ルートは薬剤溶解液で滴たすこと。交換時、投与終了時のフラッシュ禁止。残液は廃棄

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2026年02月09日 14時55分

レジメンNo. 01-079301

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT Ph ALL/MRD2025【地固め(D1)】[45kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)		day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)	day(27)	day(28)
		速度指示								
05	点滴 点滴注射 フィルター付きルート 10mL/時 24時間かけて [H] ビーリンサイト注 35 μ g 蒸留水20mL (20) 生食注 20mL (250) 生理食塩液250mL	15 μ g	/m ²	未定	未定	未定	未定	未定	未定	未定
終了										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

MTX+DEX髄注[MTX 15mg/DEX 3.3mg](day0)は別途オーダー
 アイクルシカ 30mg(MRD陽性)/15mg(MRD陰性)分1 day29~14日間以上。地固め(B1)のday-1まで
 投与ルートは薬剤溶解液で満たすこと。交換時、投与終了時のフラッシュ禁止。残液は廃棄