

マスタ内容確認シート

1 / 2

発行日時 2026年06月01日 15時52分

レジメンNo. 01-079305 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 JSCT Ph ALL/MRD2025【地固め(C1)】[16-39歳]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL							
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋							
03	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） MTX開始1時間前 全開で [H] オンコビン1mg (50)生理食塩液 50mL	1.3mg 50mL /m ²							
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 24時間で [H] メソトレキセート1000mg (500)生食500mL	2000mg 500mL /m ²							
05	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射（腰椎）（無菌加算） 指定の容器に入れて払出 総量6mL(10mLシリンジで調製) [H] メソトレキセート50mg MTX投与中に髄注を実施 [H] (3.3)デキサート3.3mg (20)生食注 20mL	15mg 3.3mg 1管 /Body							
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント ダイアモックス、ロイコボリン（またはレボ	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント アイクルシク 30mg(MRD陽性)/15mg(MRD陰性) 分1 day1～内服 ロイコボリン(またはレボリナート)のスケジュールは、MTX開始後36時間より6時間毎に計8回(別途オーダー) 70mg、NSAIDs、ST合剤、PPIなどはMTX開始前～MTX排泄完了まで使用禁止		

マスタ内容確認シート

2 / 2

発行日時 2026年06月01日 15時52分

レジメンNo. 01-079305

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT Ph ALL/MRD2025【地固め(C1)】[16-39歳]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
03	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） MTX開始1時間前 全開で [H] オンコビン1mg (50)生理食塩液 50mL	1.3mg 50mL /m ²	未定						
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 24時間で [H] メソトレキセート1000mg (500)生食500mL	2000mg 500mL /m ²	未定						
05	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射（腰椎）（無菌加算） 指定の容器に入れて払出 総量6mL (10mLシリンジで調製) [H] メソトレキセート50mg MTX投与中に髄注を実施 [H] (3.3)デキサート3.3mg (20)生食注 20mL	15mg 3.3mg 1管 /Body	未定						
終了									

適用時確認コメント ダイアモックス、ロイコボリン（またはレボ	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 7イクルシク 30mg (MRD陽性)/15mg (MRD陰性) 分1 day1～内服 ロイコボリン(またはレボ リナート) のスキューは、MTX開始後36時間より6時間毎に計8回(別途オーダー) 7ロベド、NSAIDs、ST合剤、PPIなどはMTX開始前～MTX排泄完了まで使用禁止		