

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2026年08月25日 16時45分

レジメンNo. 01-079355 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 JSCT ALL/MRD2025 (Ph-, CD19+) 【C-1】 [40-54歳] ★Erwinase★

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）								
		速度指示		day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定	未定					
03	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋		未定						
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） MTX開始1時間前 全開で [H] オンコビン 1mg (50)生理食塩液 50mL	1.3mg 50mL	/㎡	未定						
05	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） ①30分で [H] メソトレキセート 1000mg (100)生食注100mL	150mg 100mL	/㎡	未定						
06	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） ②23時間30分で（①終了後） [H] メソトレキセート 1000mg (500)生食500mL	1350mg 500mL	/㎡	未定						
07	点滴 点滴注射 開始時に加ナル錠を内服 15分で グラニセトロン注3mgバック ガスター注20mg ポラミン注5mg [H] (100)ハイドロコト注 100mg	1袋 1管 1管 1瓶			未定					
08	筋肉内 筋肉内注射（無菌製剤加算） [H] アーウィナーゼ筋注用10000 (20)生食注 20mL	6000単位 1管	/㎡		未定					
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント ダイアモックス、ロイコボリン（またはレボ	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント ロイコボリン(またはレボネート)のスケジュールは、MTX開始後36時間より6時間毎に計8回(別途オーダー) 70mg、NSAIDs、ST合剤、PPIなどはMTX開始前～MTX排泄完了まで使用禁止 day2、day16の制吐薬を開始時に加ナル 500mgを内服 ★心電図モニター装着		

2 / 4

クール日数 28日 休薬期間 0日

適用時確認コメント ダイヤモンド、ロイコボリン（またはレボ	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント ロイコボリン（またはレボコナート）の投与は、MTX開始後36時間より6時間毎に計8回（別途オーダー） アセト、NSAIDs、ST合剤、PPIなどはMTX開始前～MTX排泄完了まで使用禁止 day2、day16の制吐薬を開始時に加ナール 500mgを内服 ★心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2026年08月25日 16時45分

レジメンNo. 01-079355

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 JSCT ALL/MRD2025 (Ph-, CD19+) 【C-1】 [40-54歳] ★Erwinase★

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）		day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
		速度指示								
02	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定	未定					
03	点滴 点滴注射 1 5 分で グラニセトロン注3mgバック	1袋		未定						
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） MTX開始1時間前 全開で [H] オンコビン1 m g (50)生理食塩液 50mL	1.3mg 50mL	/㎡	未定						
05	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） ①3 0 分で [H] メソトレキセート1 0 0 0 m g (100)生食注100mL	150mg 100mL	/㎡	未定						
06	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） ②2 3 時間3 0 分で（①終了後） [H] メソトレキセート1 0 0 0 m g (500)生食500mL	1350mg 500mL	/㎡	未定						
07	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠を内服 1 5 分で グラニセトロン注3mgバック ガスター注2 0 m g ポラミン注5 m g [H] (100)ハイドロコートン注1 0 0 m g	1袋 1管 1管 1瓶			未定					
08	筋肉内 筋肉内注射（無菌製剤加算） [H] アーウィナーゼ筋注用10000 (20)生食注 20mL	6000単位 1管	/㎡		未定					
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント

ダイアモックス、ロイコボリン（またはレボ

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ロイコボリン（またはレボリナート）の投与は、MTX開始後36時間より6時間毎に計8回（別途オーダー）
70mg、NSAIDs、ST合剤、PPIなどはMTX開始前～MTX排泄完了まで使用禁止
day2、day16の制吐薬を開始時に加ナール 500mgを内服 ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2026年08月25日 16時45分

レジメンNo. 01-079355 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 JSCT ALL/MRD2025 (Ph-, CD19+) 【C-1】 [40-54歳]★Erwinase★

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
09	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射（腰椎）（無菌加算） 指定の容器に入れて払出 総量6mL (10mLシリンジで調製) [H] メソトレキセート50mg MTX投与中に髄注を実施 [H] (3.3)デキサート3.3mg (20)生食注 20mL	15mg /Body 3.3mg 1管	未定						
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
ダイアモックス、ロイコボリン（またはレボ 注意コメント ロイコリン（またはレボリナート）のリスクは、MTX開始後36時間より6時間毎に計8回（別途オーダー） プロセト、NSAIDs、ST合剤、PPIなどはMTX開始前～MTX排泄完了まで使用禁止 day2、day16の制吐薬を開始時に加ナール 500mgを内服 ★心電図モニター装着		