

マスタ内容確認シート

1 / 3

発行日時 2026年06月08日 17時57分

レジメンNo. 01-060400

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 PEM+CBDCA+Amivantamab (1コース目) [80kg未満]

3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠を内服 30分で パロノセトロン点滴静注バック0.75mg アロカリス点滴静注235mg [H] (6.6)デキサート6.6mg [H] (3.3)デキサート3.3mg ガスター注20mg ボラミン注5mg	1袋 1瓶 1管 1管 1管 1管	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 10分で [H] ベメトレキシド800mg (100)生食注100mL	500mg 100mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] カルプラン(遮光)450mg (250)5%ブドウ糖☆250mL☆	5mg 250mL	未定						
05	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 5分で 腹部に投与 [H] リプロファズ配合皮下注 20mLロックシリンジを使用	1600mg	未定						
続きあり									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 加ナール 700mg day1・8・15(前投薬) リタミン 50mg day8・15(前投薬) パルビテン 1g/分1(PEM開始の7日以上前から内服開始。最終投与日から22日目まで継続) シアノコバラミン 1Aを筋注(PEM開始の少なくとも7日前に投与。中止後22日目まで9週毎に投与)		

マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2026年06月08日 17時57分

レジメンNo. 01-060400

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 PEM+CBDCA+Amivantamab (1コース目) [80kg未満]

3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位）	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
		速度指示							
06	皮下 皮下注射（無菌製剤加算） 投与30分前に加ナール錠、レスミン錠を内服 5分で 腹部に投与 [H] リブロファズ配合皮下注 30mLロックシリンジを使用	2400mg /Body	未定						
-----続きあり-----									

適用時確認コメント

確認印

醫師

藥劑師

注意コメント

カナール 700mg day1・8・15(前投薬) イスタン 50mg day8・15(前投薬)
バンビタン 1g/分1(PEM開始の7日以上前から内服開始。最終投与日から22日目まで継続)
シアノバリン 1Aを筋注(PEM開始の少なくとも7日前に投与。中止後22日目まで9週毎に投与)

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2026年06月08日 17時57分

レジメンNo. 01-060400		クール日数 21日		休薬期間 0日					
レジメン名称 PEM+CBDCA+Amivantamab (1コース目) [80kg未満]		3週1コース							
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
06	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 投与30分前に加ナール錠、レスタミン錠を内服 5分で 腹部に投与 [H] リブロファズ配合皮下注 30mLロックシリンジを使用	2400mg /Body	未定						
―― 終了 ――									
適用時確認コメント									
確認印									
医師 薬剤師									
注意コメント 加ナール 700mg day1・8・15(前投薬) レスタミン 50mg day8・15(前投薬) パニピタン 1g/分1 (PEM開始の7日以上前から内服開始。最終投与日から22日目まで継続) シアコパラミン 1Aを筋注 (PEM開始の少なくとも7日前に投与。中止後22日目まで9週毎に投与)									