

マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2026年06月16日 08時44分

レジメンNo. 01-060401 クール日数 21日 休薬期間 0日
レジメン名称 PEM+CBDCA+Amivantamab (2-4コース目) [80kg未満] 3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	速度指示						
			day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠を内服 3 0 分で パロノセトロン点滴静注バック0. 75mg アロカリス点滴静注2 3 5 m g [H] (6. 6) デキサート6. 6mg [H] (3. 3) デキサート3. 3mg ポララミン注5 m g	1 袋 1 瓶 1 管 1 管 1 管	未定						
03	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 1 0 分で [H] ペメトレキセド8 0 0 m g (100) 生食注100mL	500mg 100mL	/m ²	未定					
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 6 0 分で [H] カルプラチン(遮光) 450mg (250) 5 % ブドウ糖☆250mL ☆	5mg 250mL	/GFR+25	未定					
05	皮下 皮下注射（無菌製剤加算） 5 分 で 腹部に投与 [H] リプロファズ配合皮下注 30mLロックシリンジ [®] を使用	2400mg	/Body	未定					
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 加ナール 700mg day1 (前投薬) パルチン 1g/分1 (PEM開始の7日以上前から内服開始。最終投与日から22日目まで継続) シアノバリン 1Aを筋注 (PEM開始の少なくとも7日前に投与。中止後22日目まで9週毎に投与)		