

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040433 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2 (1コース目) [42kg以上]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠、ヒタミン錠を内服 30分で [H] (20)プレドニン20mg (100)生食注100mL	100mg 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 プレドニン投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2.5時間で(目安) 70mL/時(30分)→100mL/時(残液) [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (250)生理食塩液250mL 蒸留水20mL	12mg 250mL 1管 /kg	未定						
06	点滴 点滴注射 ミンジュビ投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
07	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 50mL/時→30分毎に50mL/時を増速→400mL/時 [BS] リツキシマブ500mg (500)生食500mL	375mg 500mL /m ²	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント ヒタリドミド 20mg/日 day1-21 プレドニン開始時に加ナール錠 700mg、ヒタミン錠 50mgを内服		

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040433 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2 (1コース目) [42kg以上]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 開始時にカナール錠、リタミン錠を内服 30分で [H] (20)プレドニン20mg (100)生食注100mL	100mg 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 プレドニン投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で (目安) 125mL/時 [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (250)生理食塩液250mL 蒸留水20mL	12mg /kg 250mL 1管	未定						
06	点滴 点滴注射 ミンジュビ投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
08	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 100mL/時 (30分)→200mL/時 (60分) [BS] リツキシマブ500mg (250)生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント レタリドミド 20mg/日 day1-21 プレドニン開始時にカナール錠 700mg、リタミン錠 50mgを内服		

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040433

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (1コース目) [42kg以上]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナル錠、ヒタミン錠を内服 30分で [H] (20) プレドニン 20mg (100) 生食注100mL	100mg 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 プレドニン投与後のラインフラッシュ (50) 生理食塩液 50mL	50mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で (目安) 125mL/時 [H] ミンジュビ点滴静注用 200mg (250) 生理食塩液250mL 蒸留水20mL	12mg 250mL 1管 /kg	未定						
06	点滴 点滴注射 ミンジュビ投与後のラインフラッシュ (50) 生理食塩液 50mL	50mL	未定						
08	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 100mL/時 (30分) → 200mL/時 (60分) [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL	375mg 250mL /m ²	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント プレドニン 20mg/日 day1-21 プレドニン開始時に加ナル錠 700mg、ヒタミン錠 50mgを内服		

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040433 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2（1コース目）[42kg以上]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠、レスタミン錠を内服 30分で [H] (20) プレドニン20mg (100)生食注100mL	100mg 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 プレドニン投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
05	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2時間で（目安） 125mL/時 [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (250)生理食塩液250mL 蒸留水20mL	12mg /kg 250mL 1管	未定						
06	点滴 点滴注射 ミンジュビ投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
08	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 総液量 250mLに調製 100mL/時(30分)→200mL/時(60分) [BS] リツキシマブ500mg (250)生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント プレドニン 20mg/日 day1-21 プレドニン開始時に加ナール錠 700mg、レスタミン錠 50mgを内服		