

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040434 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2（2-3コース目）[42kg以上]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2時間で（目安） 125mL/時 [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (250) 生理食塩液250mL 蒸留水20mL	12mg /kg 250mL 1管	未定						
03	点滴 点滴注射 ミンジュビ投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 総液量 250mLに調製 100mL/時(30分)→200mL/時(60分) [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント レキトミド 20mg/日 day1-21 ミンジュビ 開始時にプレドニソロン錠 200mg、ヒスタミン錠 20mgを内服(day1のみ) 前回投与時にinfusion reactionあり→プレドニソロン点滴、加ナール錠/ヒスタミン錠の前投薬を考慮		

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメン N o. 01-040434

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (2-3コース目) [42kg以上]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
		速度指示							
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2時間で（目安） 125mL/時 [H] ミンジユピ点滴静注用200mg (250) 生理食塩液250mL 蒸留水20mL	12mg /kg 250mL 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

藥劑師

注意コメント

レナリトミド 20mg/日 day1-21

※開始時にブ・ルフェン錠 200mg、レタミン錠 20mgを内服(day1のみ)

前回投与時にinfusion reactionあり→ブレイク点滴、加ナール錠/レスタミン錠の前投薬を考慮

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040434

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (2-3コース目) [42kg以上]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
		速度指示							
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2時間で（目安） 125mL/時 [H] ミンジユピ点滴静注用200mg (250) 生理食塩液250mL 蒸留水20mL	12mg /kg 250mL 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

醫師

藥劑師

注意コメント

レリトミド 20mg/日 day1-21

※ 開始時にブルーエン錠 200mg、リタミン錠 20mgを内服(day1のみ)

前回投与時にinfusion reactionあり→ブレイク点滴、加ナール錠/レスタミン錠の前投薬を考慮

4 / 4

レジメンNo. 01-040434

クール日数 28日 休薬期間 0日

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント レリトミド 20mg/日 day1-21 ミシゲル 開始時にブルフェン錠 200mg、レスタミン錠 20mgを内服(day1のみ) 前回投与時にinfusion reactionあり→ブレード点滴、加ナル錠/レスタミン錠の前投薬を考慮		