マスタ内容確認シート

発行日時　2026年10月05日　17時03分

レジメンＮｏ．　01-040437　　クール日数　28日　休薬期間　0日

レジメン名称　ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ+R2（1ｺｰｽ目）

RpNo　薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01　点滴			未定						
点滴注射									
投与前後に使用									
(100)生食注100mL	1瓶								
02　点滴			未定						
点滴注射（無菌製剤加算）									
30分毎に50mL/時ずつ増速→400mL/時まで									
50mL/時で開始									
[BS] リツキシマブ500mg	375mg	/㎡							
(500)生食500mL	500mL								
04　皮下			未定						
皮下注射(無菌製剤加算)									
大腿部、腹部									
1mL採液(2.5mLｼﾘﾝｼﾞを使用)									
[H] エプキンリ４ｍｇ	0.16mg	/Body							
(20)生食注 20mL	1管								

続きあり

適用時確認コメント	確認印 医師	確認印 薬剤師
注意コメント ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ 20mg/日 day1-21 PSL 100mg/body day1･8･15･22(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25 ﾚｽﾀﾐﾝ錠 50mg、ｶﾛﾅｰﾙ錠 700mg day1･8･15･22(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前)に内服		

マスタ内容確認シート

発行日時　2026年10月05日　17時03分

レジメンＮｏ．　01-040437　　クール日数　28日　休薬期間　0日

レジメン名称　ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ+R2（1ｺｰｽ目）

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示		day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	点滴			未定						
	点滴注射									
	投与前後に使用									
	(100)生食注100mL	1瓶								
03	点滴			未定						
	点滴注射（無菌製剤加算）									
	総液量 250mLに調製									
	100mL/時(30分)→200mL/時(60分)									
	[BS] リツキシマブ500mg	375mg	/㎡							
	(250) 生理食塩液250mL	250mL								
05	皮下			未定						
	皮下注射(無菌製剤加算)									
	大腿部、腹部									
	1mL採液(2.5mLｼﾘﾝｼﾞを使用)									
	[H] エプキンリ４ｍｇ	0.8mg	/Body							
	(20)生食注 20mL	1管								
	----------続きあり----------									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ 20mg/日 day1-21 PSL 100mg/body day1･8･15･22(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25 ﾚｽﾀﾐﾝ錠 50mg、ｶﾛﾅｰﾙ錠 700mg day1･8･15･22(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前)に内服		

マスタ内容確認シート

発行日時　2026年10月05日　17時03分

レジメンＮｏ．　01-040437　　クール日数　28日　休薬期間　0日

レジメン名称　ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ+R2（1ｺｰｽ目）

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示		day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	点滴			未定						
	点滴注射									
	投与前後に使用									
	(100)生食注100mL	1瓶								
03	点滴			未定						
	点滴注射（無菌製剤加算）									
	総液量 250mLに調製									
	100mL/時(30分)→200mL/時(60分)									
	[BS] リツキシマブ500mg	375mg	/㎡							
	(250) 生理食塩液250mL	250mL								
06	皮下			未定						
	皮下注射(無菌製剤加算)									
	大腿部、腹部									
	0.6mL採液(2.5mLｼﾘﾝｼﾞを使用)									
	[H] エプキンリ４ｍｇ	3mg	/Body							
	続きあり									

適用時確認コメント	確認印 医師	確認印 薬剤師
注意コメント ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ 20mg/日 day1-21 PSL 100mg/body day1･8･15･22(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25 ﾚｽﾀﾐﾝ錠 50mg、ｶﾛﾅｰﾙ錠 700mg day1･8･15･22(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前)に内服		

マスタ内容確認シート

発行日時　2026年10月05日　17時03分

レジメンＮｏ．　01-040437　　クール日数　28日　休薬期間　0日

レジメン名称　ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ+R2（1ｺｰｽ目）

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示		day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)	day(27)	day(28)
01	点滴			未定						
	点滴注射									
	投与前後に使用									
	(100)生食注100mL	1瓶								
03	点滴			未定						
	点滴注射（無菌製剤加算）									
	総液量 250mLに調製									
	100mL/時(30分)→200mL/時(60分)									
	[BS] リツキシマブ500mg	375mg	/㎡							
	(250) 生理食塩液250mL	250mL								
07	皮下			未定						
	皮下注射(無菌製剤加算)									
	大腿部、腹部									
	0.8mL採液(2.5mLｼﾘﾝｼﾞを使用)									
	[H] エプキンリ４８ｍｇ	48mg	/Body							
	終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ 20mg/日 day1-21 PSL 100mg/body day1･8･15･22(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25 ﾚｽﾀﾐﾝ錠 50mg、ｶﾛﾅｰﾙ錠 700mg day1･8･15･22(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前)に内服		