

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040429 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2（1コース目）[42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）	day（6）	day（7）
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠、リタミン錠を内服 30分で [H] (20)プレドニン20mg (100)生食注100mL	100mg 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 プレドニン投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2.5時間(150分)で [H] ミンジユピ点滴静注用200mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1管	未定						
06	点滴 点滴注射 ミンジユピ投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
07	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 50mL/時→30分毎に50mL/時を増速→400mL/時 [BS] リツキシマブ500mg (500)生食500mL	375mg /m ² 500mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント プレドニン 20mg/日 day1-21 プレドニン開始時に加ナール錠 700mg、リタミン錠 50mgを内服		

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040429 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2（1コース目）[42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠、レタミン錠を内服 30分で [H] (20) プレドニン 20mg (100)生食注100mL	100mg 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 プレドニン投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
05	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2時間で [H] ミンジュビ点滴静注用 200mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1管	未定						
06	点滴 点滴注射 ミンジュビ投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
08	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 総液量 250mLに調製 100mL/時(30分)→200mL/時(60分) [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント レリドミド 20mg/日 day1-21 プレドニン開始時に加ナール錠 700mg、レタミン錠 50mgを内服		

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040429

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (1コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナル錠、レスタミン錠を内服 30分で [H] (20) プレドニン20mg (100)生食注100mL	100mg 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 プレドニン投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1管	未定						
06	点滴 点滴注射 ミンジュビ投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
08	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 100mL/時 (30分)→200mL/時 (60分) [BS] リツキシマブ500mg (250)生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
続きあり									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

プレドニン 20mg/日 day1-21
プレドニン開始時に加ナル錠 700mg、レスタミン錠 50mgを内服

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040429

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (1コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL							
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠、レスタミン錠を内服 30分で [H] (20) プレドニン20mg (100)生食注100mL	100mg 100mL							
03	点滴 点滴注射 プレドニン投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL							
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1管							
06	点滴 点滴注射 ミンジュビ投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL							
08	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 100mL/時(30分)→200mL/時(60分) [BS] リツキシマブ500mg (250)生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL							
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

プレドニン 20mg/日 day1-21
プレドニン開始時に加ナール錠 700mg、レスタミン錠 50mgを内服