

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040430 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2 (2-3コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1管	未定						
03	点滴 点滴注射 ミンジュビ投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 100mL/時(30分)→200mL/時(60分) [BS] リツキシマブ500mg (250)生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント けリトミド 20mg/日 day1-21 ミンジュビ 開始時にブルフェン錠 200mg、レスタミン錠 20mgを内服(day1のみ) 前回投与時にinfusion reactionあり→ブルトロン点滴、加ナール錠/レスタミン錠の前投薬を考慮		

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040430

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (2-3コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位） 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2 時間で [H] ミンジュビ点滴静注用 2 0 0 m g (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1 管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

醫師

藥劑師

注意コメント

レタドミド 20mg/日 day1-21

ミンゾピ 開始時にブルフエン錠 200mg、リタミン錠 20mgを内服(day1のみ)

前回投与時にinfusion reactionあり→ブ・レ・ト・ン点滴、加ナール錠/レスタミン錠の前投薬を考慮

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040430

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (2-3コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1管	未定						
-----続きあり-----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レリドミド 20mg/日 day1-21

ミンジュビ 開始時にプレドニソロン 200mg、ヒスタミン錠 20mgを内服(day1のみ)

前回投与時にinfusion reactionあり→プレドニソロン点滴、加ナール錠/ヒスタミン錠の前投薬を考慮

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040430

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (2-3コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
		速度指示							
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2 時間で [H] ミンジュビ点滴静注用 2 0 0 m g (100) 生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1 管	未定						
―― 終了 ――									

適用時確認コメント

確認印

醫師

藥劑師

注意コメント

レタリトミト 20mg/日 day1-21

※ 開始時にブレン錠 200mg、リタミン錠 20mgを内服(day1のみ)

前回投与時にinfusion reactionあり→ブレイブ点滴、加ナール錠/レスタミン錠の前投薬を考慮