

マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2023年09月19日 16時26分

レジメンNo. 01-060130

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 PEM+CDDP (short hydration) 3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 30分で パロノセトロン点滴静注バック0.75mg アロカリス点滴静注235mg [H] (6.6)デキサート6.6mg [H] (3.3)デキサート3.3mg	1袋 1瓶 1管 1管	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 10分で [H] ペメトレキセド800mg (100)生食注100mL	500mg /m ² 100mL	未定						
04	点滴 点滴注射 60分で (500)ソルデム1輸液 500mL [H] アスパラギン酸カリウム注キット(10mEq) 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/mL)	1袋 1キット 8mL	未定						
05	点滴 点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300mL	300mL	未定						
06	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で [H] シスプラチン(遮光)50mg (D1) (500)生食500mL	75mg /m ² 500mL	未定						
07	点滴 点滴注射 60分で (500)ソルデム1輸液 500mL [H] アスパラギン酸カリウム注キット(10mEq)	1袋 1キット	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

PEM開始の7日以上前からパロノセトロン 1g/分1で内服→最終投与日から22日目まで基本継続
PEM開始の7日以上前からマフロン 1Aを筋注→PEM中止後22日目まで9週毎に投与
心電図モニター装着