

# マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2023年09月19日 16時26分

レジメンNo. 01-060136

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 PEM+CBDCA+Pembrolizumab 3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 フィルター付きルート 30分で [H] キイトルーダ100mg (100)生食注100mL	200mg /Body 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 30分で パロノセトロン点滴静注バック0.75mg アロカリス点滴静注235mg [H] (6.6)デキサート6.6mg [H] (3.3)デキサート3.3mg	1袋 1瓶 1管 1管	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 10分で [H] ペメトレキセド800mg (100)生食注100mL	500mg /m <sup>2</sup> 100mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] カルボプラチン(遮光)450mg (250)生理食塩液250mL	5mg /GFR+25 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

PEM開始の7日以上前からパニピタン 1g/分1で内服→最終投与日から22日目まで基本継続  
PEM開始の7日以上前からマブロン 1Aを筋注→PEM中止後22日目まで9週毎に投与  
心電図モニター装着