

マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2024年08月16日 09時41分

レジメンNo. 01-070112

クール日数 14日 休業期間 0日

レジメン名称 **ピキセオス (寛解導入) [1サイクル目]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定		未定		未定		
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgパック	1袋	未定		未定		未定		
03	点滴 点滴注射 グラニセトロン投与後のラインフラッシュ 全開 (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定		未定		未定		
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター使用禁止 90分で [H] ピキセオス (DNR/AraC 44mg/100mg) (500)生食500mL 蒸留水20mL 溶解/希釈後は4時間以内に投与開始	44mg /m ² 500mL 1管	未定		未定		未定		
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

1サイクル目に寛解に到達しなかった患者で、本剤への忍容性が良好な場合、1サイクル目の投与開始から2~5週間後に寛解導入(2サイクル目)を投与する。
寛解導入は最大2サイクルまで 心電図モニター装着