

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-079172

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **JALSG ALL202-0 (25~64歳) (地固め療法 course2)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
				未定	未定					
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL		1瓶	未定	未定					
03	点滴 点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バック0.75mg [H] (3.3)デキサート3.3mg [H] (6.6)デキサート6.6mg		1袋 1管 1管	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) MTX開始の1時間前に投与! 60分で [H] オンコビン1mg (100)生食注100mL	1.3mg	/m ² 100mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量1000mLとなるように調製 24時間で [H] メソトレキセート1000mg (FC1)生理食塩液FC1Lバッグ	3000mg	/m ² 1000mL	未定						
06	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射 (腰椎) (無菌加算) Total 6mL (10mLロックシリンジで) MTX開始2時間後~終了までの間に実施! [H] メソトレキセート50mg [H] (3.3)デキサート3.3mg (20)生食注 20mL	15mg	/Body 3.3mg 1管	未定						
07	静脈内注射 静脈内注射 MTX開始36時間後 (投与終了の12時間後) ロイコボリン注3mg		17管		22:00					
08	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg		15mg			04:00				
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント GMP (ロイケリ) 25mg/m ² 1日1回就寝前に内服 day1~21 MTX: 50歳以上は「1500mg/m ² 」に減量 心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2021年04月16日 17時15分

レジメンNo. 01-079172

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **JALSG ALL202-0 (25~64歳) (地固め療法 course2)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示		day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
09	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²			10:00				
10	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²			16:00				
11	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²			22:00				
12	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²				04:00			
13	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²				10:00			
14	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²				16:00			
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント GMP (ロイリン) 25mg/m ² 1日1回就寝前に内服 day1~21 MTX : 50歳以上は「1500mg/m ² 」に減量 心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-079172

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 JALSG ALL202-0 (25~64歳) (地固め療法 course2)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示		day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
02	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL		1瓶	未定	未定					
03	点滴 点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バック0.75mg [H] (3.3)デキサート3.3mg [H] (6.6)デキサート6.6mg		1袋 1管 1管	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) MTX開始の1時間前に投与! 60分で [H] オンコビン1mg (100)生食注100mL	1.3mg 100mL	/m ²	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量1000mLとなるように調製 24時間で [H] メソトレキセート1000mg (FC1)生理食塩液FC1Lバッグ	3000mg 1000mL	/m ²	未定						
06	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射 (腰椎) (無菌加算) Total 6mL (10mLロックシリンジで) MTX開始2時間後~終了までの間に実施! [H] メソトレキセート50mg [H] (3.3)デキサート3.3mg (20)生食注 20mL	15mg 3.3mg 1管	/Body	未定						
15	静脈内注射 静脈内注射 MTX開始36時間後 (投与終了の12時間後) ロイコポリン注3mg		17管		22:00					
16	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコポリン注3mg		15mg			04:00				
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 6MP (ロイケリン) 25mg/m ² 1日1回就寝前に内服 day1~21 MTX: 50歳以上は「1500mg/m ² 」に減量 心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2021年04月16日 17時15分

レジメンNo. 01-079172

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **JALSG ALL202-0 (25~64歳) (地固め療法 course2)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示		day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
17	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²			10:00				
18	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²			16:00				
19	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²			22:00				
20	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²				04:00			
21	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²				10:00			
22	静脈内注射 静脈内注射 6時間毎 ロイコボリン注3mg	15mg	/m ²				16:00			
----- 終了 -----										

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 6MP (ロイリン) 25mg/m ² 1日1回就寝前に内服 day1~21 MTX : 50歳以上は「1500mg/m ² 」に減量 心電図モニター装着		