

マスタ内容確認シート

1 / 2

発行日時 2024年10月17日 08時22分

レジメンNo. 01-079261

クール日数 6日 休業期間 0日

レジメン名称 JSCT ALL/MRD2023 (Ph-, CD19-) 【地固め(B-1、B-2)】 [56-65歳]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
		速度指示								
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定	未定	未定	未定	未定		
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋		未定	未定	未定	未定			
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H] ノバントロン20mg (100)生食注100mL	7mg 100mL	/m ²		未定	未定				
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 3時間で [H] キロサイドN1g (500)生食500mL	1500mg 500mL	/m ²	未定	未定	未定	未定			
05	点滴 点滴注射 開始時に加ナル錠を内服 15分で グラニセトロン注3mgバック ガスター注20mg ポララミン注5mg [H] (100)ハイドロコートン注100mg	1袋 1管 1管 1瓶						未定		
06	点滴 点滴注射 制吐薬投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL						未定		
07	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で [H] オンキヤスパー点滴静注用3750 (100)生食注100mL 蒸留水20mL	750単位 100mL 1管	/m ²					未定		
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント

フィルグラスチムは別途、注射オーダー

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

フィルグラスチム 150μg(皮下)または300μg(点滴) day6以降(好中球数≥5000まで)
day5の制吐薬を開始時に加ナル 500mgを内服
心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 2

発行日時 2024年10月17日 08時22分

レジメンNo. 01-079261

クール日数 6日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT ALL/MRD2023 (Ph-, CD19-) 【地固め(B-1、B-2)】 [56-65歳]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
08	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射 (腰椎) (無菌加算) 指定の容器に入れて払出 総量6mL (10mLシリンジ*で調製) [H] メソトレキセート 50mg [H] (3.3) デキサセート 3.3mg (20) 生食注 20mL	15mg /Body 3.3mg 1管	未定						
----- 終了 -----									

適用時確認コメント フィルグラスチムは別途、注射オーダー	確認印	
注意コメント フィルグラスチム 150μg(皮下)または300μg(点滴) day6以降(好中球数≥5000まで) day5の制吐薬を開始時に加ナル 500mgを内服 心電図モニター装着	医師	薬剤師