

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-040102

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 R-CHOP (同日投与 ★RIT 90分) [2回目以降]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 100mL/時 (30分)→200mL/時 (60分) 総液量 250mLに調製 [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL BDフアール使用	375mg /m ² 250mL	未定						
03	点滴 点滴注射 15分で BDフアール使用 アロキシ点滴静注バック0.75mg	1袋	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 全開で BDフアール使用 [H] オンコピン1mg (50)生理食塩液 50mL	1.4mg /m ² 50mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で BDフアール使用 [H] ドキソルビシン注50mg (100)生食注100mL	50mg /m ² 100mL	未定						
06	点滴 点滴注射【閉鎖系無菌加算(1)】 2時間で BDフアール使用 [H] エンドキサン500mg (250) 生理食塩液250mL	750mg /m ² 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント
90分投与は「悪性リンパ腫」のみ

確認印

医師 薬剤師

注意コメント
投与30分前にブルフェン 2錠、メタミン 2錠を予防内服 心電図モニター装着
プレドニゾン 60mg/m² (または100mg/body) CHOP開始日～5日間
イトラコザール、ホリコザール、ホサコザール、フルコザールをCHOP当日と前後1日のみ休薬