

# マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2022年01月14日 16時38分

レジメンNo. 01-040121

クール日数 21日 休業期間 0日

レジメン名称 **G-CHOP (2-6コース目) [ガザイバ時短]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 25mL/時 (30分)→225mL/時まで増速可 ★1コース目でGr3以上のIRが無かった場合 [H] ガザイバ1000mg フィルター付ルート BDフアシル使用 (250) 生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	1000mg /Body 210mL	未定						
03	点滴 点滴注射 ラインフラッシュ ルート交換 (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 15分で BDフアシル使用 アロキシ点滴静注バック0.75mg	1袋	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 全開で BDフアシル使用 [H] オンコピン1mg (50)生理食塩液 50mL	1.4mg /m <sup>2</sup> 50mL	未定						
06	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で BDフアシル使用 [H] ドキソルピシン注50mg (100)生食注100mL	50mg /m <sup>2</sup> 100mL	未定						
07	点滴 点滴注射【閉鎖系無菌加算(1)】 2時間で [H] エンドキサン500mg (250)生理食塩液250mL	750mg /m <sup>2</sup> 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント IR予防:ガザイバ投与30分~1時間前にブルフェン・レスタミン内服 心電図モニター装着 プレートニロン 60mg/m <sup>2</sup> (または100mg/body) day1-5 イトラコザール、ホリコザール、ホサコザール、フルコザールをCHOP当日と前後1日のみ休業		