

# マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2021年09月27日 17時08分

レジメンNo. 01-040421

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 Pola-BR (2-6コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			未定	未定					
01	点滴 点滴注射 ルートキープ用 (250)生理食塩液250mL	250mL	未定	未定					
02	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) [2回目~]100→200→300→400mL/時(30分毎) [初回]50mL/時→30分毎に50mL/時→400mL/時 [BS]リツキシマブ500mg (500)生食500mL BDフアール使用	375mg /m <sup>2</sup> 500mL	未定						
03	点滴 点滴注射 15分で BDフアール使用 グラニセトロン注3mgバック [H](6.6)デキサート6.6mg [H](3.3)デキサート3.3mg	1袋 1管 1管	未定	未定					
04	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) フィルター付きルート BDフアール使用 30分で [H]ポライビー30mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	1.8mg /kg 100mL 1管	未定						
05	点滴 点滴注射【閉鎖系無菌加算(1)】 調製後3時間以内に投与完了 60分で [H]トレアキシン100mg (250)生理食塩液250mL 蒸留水100mL	90mg /m <sup>2</sup> 250mL 1瓶	未定	未定					
06	点滴 点滴注射 フラッシュ用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

IR予防: リツキシマブ 投与30分前にブルフェン 2錠、リスタミン 2錠を内服  
心電図モニター装着