

マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2021年09月27日 16時49分

レジメンNo. 01-040422

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 Pola-BR (2-6コース ★RIT 90分)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
			未定	未定					
01	点滴 点滴注射 ルートキープ用 (250) 生理食塩液250mL	250mL	未定	未定					
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 BDフアシル使用 100mL/時(30分)→200mL/時(60分) [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
03	点滴 点滴注射 15分で BDフアシル使用 グラニセトロン注3mgバック [H] (6.6) デキサート6.6mg [H] (3.3) デキサート3.3mg	1袋 1管 1管	未定	未定					
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート BDフアシル使用 30分で [H] ポライビー30mg (100) 生食注100mL 蒸留水20mL	1.8mg /kg 100mL 1管	未定						
05	点滴 点滴注射【閉鎖系無菌加算(1)】 調製後3時間以内に投与完了 60分で [H] トレアキシシン100mg (250) 生理食塩液250mL 蒸留水100mL	90mg /m ² 250mL 1瓶	未定	未定					
06	点滴 点滴注射 フラッシュ用 (100) 生食注100mL	100mL	未定	未定					
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

IR予防: リツキシマブ 投与30分前にブルフェン 2錠、メスタミン 2錠を内服
心電図モニター装着