

マスタ内容確認シート

発行日時 2022年06月01日 11時05分

レジメンNo. 01-040410

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 **G-Benda (2-6コース) [ガザイバ時短]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 25mL/時(30分)→225mL/時まで増速可 ★1コース目でGr3以上のIRが無かった場合 [H] ガザイバ1000mg フィルター付ルート BDフアシル使用 (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	1000mg /Body 210mL	未定						
03	点滴 点滴注射 15分で BDフアシル使用 グラニセトロン注3mgバック [H] (3.3)デキササート3.3mg [H] (6.6)デキササート6.6mg	1袋 1管 1管	未定	未定					
04	点滴 点滴注射【閉鎖系無菌加算(1)】 10分で [H] トレアキシシ静注液100mg (50)生理食塩液 50mL	90mg /m ² 50mL	未定	未定					
終了									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント IR予防:ガザイバ投与30分~1時間前にブルフェン・レスタミン内服 心電図モニター装着 IR (Gr2以下): 中断前の半分以下の速度で再開→30分後に225mL/時まで増速可 IR (Gr3): 中断前の半分以下かつ100mL/時以下で再開。30分毎に12.5mL/時ずつ100mL/時まで	医師	薬剤師