

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-040273

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (1コース)**

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | day(6) | day(7) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01 | 点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL | 100mL | 未定 | | | | | | |
| 02 | 点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 50mL→100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス400mg (FC1)生理食塩液FC1Lバッグ | 16mg /kg 1000mL | 未定 | | | | | | |
| 08 | 皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラザレックス投与終了後に投与 [H] ベルケイド3mg (20)生食注 20mL | 1.3mg /m ² 1管 | 未定 | | | 未定 | | | |
| ----- 続きあり ----- | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 適用時確認コメント | 確認印 | |
| 注意コメント レナテックス 20mg day1・8・15・22・29・36 (ダラザレックス開始1時間前に内服) カロナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg (任意) をダラザレックス開始1時間前に内服 アルケラン 9mg/m ² (分1) day1-4、PSL 60mg/m ² day2-4に内服 ★心電図モニター装着 | 医師 | 薬剤師 |

マスタ内容確認シート

2 / 6

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040273

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 D-MPB (1コース)

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01 | 点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL | 100mL | 未定 | | | | | | |
| 03 | 点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 50mL→100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL ★初回の開始3時間以内にIRがない場合 | 16mg /kg 500mL | 未定 | | | | | | |
| 09 | 皮下 皮下注射 (無菌製剤加算) ダラザレックス投与終了後に投与 [H] ベルケイド 3mg (20)生食注 20mL | 1.3mg /m ² 1管 | 未定 | | | 未定 | | | |
| ----- 続きあり ----- | | | | | | | | | |

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レナックス 20mg day1・8・15・22・29・36 (ダラザレックス開始1時間前に内服)
 カロナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg (任意) をダラザレックス開始1時間前に内服
 アルケラン 9mg/m² (分1) day1-4、PSL 60mg/m² day2-4に内服 ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 6

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040273

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (1コース)**

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day (15) | day (16) | day (17) | day (18) | day (19) | day (20) | day (21) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01 | 点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL | 100mL | 未定 | | | | | | |
| 04 | 点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス400mg (500)生食500mL ★初回・2回目に100mL/時以上でIRなし | 16mg /kg 500mL | 未定 | | | | | | |
| ----- 続きあり ----- | | | | | | | | | |

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レテックス 20mg day1・8・15・22・29・36 (ダラザレックス開始1時間前に内服)
 カロナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg (任意) をダラザレックス開始1時間前に内服
 アルケラン 9mg/m² (分1) day1-4、PSL 60mg/m² day2-4に内服 ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

4 / 6

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040273

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (1コース)**

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day (22) | day (23) | day (24) | day (25) | day (26) | day (27) | day (28) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| 01 | 点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL | 100mL | 未定 | | | | | | |
| 05 | 点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL | 16mg /kg 500mL | 未定 | | | | | | |
| 10 | 皮下 皮下注射 (無菌製剤加算) ダラザレックス投与終了後に投与 [H] ベルケイド 3mg (20)生食注 20mL | 1.3mg /m ² 1管 | 未定 | | | 未定 | | | |
| ----- 続きあり ----- | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 適用時確認コメント | 確認印 | |
| | 医師 | 薬剤師 |
| 注意コメント レテックス 20mg day1・8・15・22・29・36 (ダラザレックス開始1時間前に内服) カロナール 700mg、ビタミン 50mg、モンテルカスト 10mg (任意) をダラザレックス開始1時間前に内服 アルケラン 9mg/m ² (分1) day1-4、PSL 60mg/m ² day2-4に内服 ★心電図モニター装着 | | |

マスタ内容確認シート

5 / 6

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040273

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (1コース)**

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day (29) | day (30) | day (31) | day (32) | day (33) | day (34) | day (35) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01 | 点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL | 100mL | 未定 | | | | | | |
| 06 | 点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL | 16mg /kg 500mL | 未定 | | | | | | |
| 11 | 皮下 皮下注射 (無菌製剤加算) ダラザレックス投与終了後に投与 [H] ベルケイド 3mg (20)生食注 20mL | 1.3mg /m ² 1管 | 未定 | | | 未定 | | | |
| ----- 続きあり ----- | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 適用時確認コメント 注意コメント レテックス 20mg day1・8・15・22・29・36 (ダラザレックス開始1時間前に内服) カロナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg (任意) をダラザレックス開始1時間前に内服 アルケラン 9mg/m ² (分1) day1-4、PSL 60mg/m ² day2-4に内服 ★心電図モニター装着 | 確認印 医師 薬剤師 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040273

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 D-MPB (1コース)

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day (36) | day (37) | day (38) | day (39) | day (40) | day (41) | day (42) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01 | 点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL | 100mL | 未定 | | | | | | |
| 07 | 点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス400mg (500)生食500mL | 16mg /kg 500mL | 未定 | | | | | | |
| ----- 終了 ----- | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 適用時確認コメント | 確認印 | |
| 注意コメント レナックス 20mg day1・8・15・22・29・36 (ダラザレックス開始1時間前に内服) カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg (任意) をダラザレックス開始1時間前に内服 アルケラン 9mg/m ² (分1) day1-4、PSL 60mg/m ² day2-4に内服 ★心電図モニター装着 | 医師 | 薬剤師 |