

# マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-040367

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Dara-CyBorD (1-2コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 30mLシリンジで払い出し [H] ダラキューロ皮下注15mL	15mL	/Body	未定						
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラキューロ投与終了後に投与 [H] ベルケイド3mg (20)生食注 20mL	1.3mg 1管	/㎡	未定						
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント エドキシン 300mg/㎡ (分1) day1・8・15・22 レテックス 40mg/日 day1・8・15・22 70歳以上、BMI<18.5、コントロール不良の糖尿病などがある場合は、レテックス 20mg/日へ減量	医師	薬剤師

# マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2022年06月01日 10時57分

レジメンNo. 01-040367

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Dara-CyBorD (1-2コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
			未定						
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 30mLシリンジで払い出し [H] ダラキューロ皮下注15mL	15mL /Body	未定						
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラキューロ投与終了後に投与 [H] ペルケイド3mg (20)生食注 20mL	1.3mg /m <sup>2</sup> 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

エンドキサン 300mg/m<sup>2</sup> (分1) day1・8・15・22

レテックス 40mg/日 day1・8・15・22

70歳以上、BMI<18.5、コントロール不良の糖尿病などがある場合は、レテックス 20mg/日へ減量

# マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2022年06月01日 10時57分

レジメンNo. 01-040367

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Dara-CyBorD (1-2コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 30mLシリンジで払い出し [H] ダラキューロ皮下注15mL	15mL	/Body	未定						
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラキューロ投与終了後に投与 [H] ベルケイド3mg (20)生食注 20mL	1.3mg 1管	/㎡	未定						
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

エンドキサン 300mg/㎡ (分1) day1・8・15・22

レナテックス 40mg/日 day1・8・15・22

70歳以上、BMI<18.5、コントロール不良の糖尿病などがある場合は、レナテックス 20mg/日へ減量

# マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2022年06月01日 10時57分

レジメンNo. 01-040367

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Dara-CyBorD (1-2コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 30mLシリンジで払い出し [H] ダラキューロ皮下注15mL	15mL	/Body	未定						
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラキューロ投与終了後に投与 [H] ベルケイド3mg (20)生食注 20mL	1.3mg 1管	/㎡	未定						
----- 終了 -----										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

インドキサン 300mg/㎡ (分1) day1・8・15・22

レナテックス 40mg/日 day1・8・15・22

70歳以上、BMI<18.5、コントロール不良の糖尿病などがある場合は、レナテックス 20mg/日へ減量