

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-040368

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Dara-CyBorD (3-6コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 30mLシリンジで払い出し [H] ダラキューロ皮下注15mL	15mL /Body	未定						
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラキューロ投与終了後に投与 [H] ペルケイド3mg (20)生食注 20mL	1.3mg /㎡ 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント エンドキサン 300mg/㎡ (分1) day1・8・15・22 レテックス 40mg/日 day1・8・15・22 カロナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg(任意)をDARA1時間前に内服 70歳以上、BMI < 18.5、コントロール不良の糖尿病などがある場合は、レテックス 20mg/日へ減量		

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2022年06月10日 16時47分

レジメンNo. 01-040368

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Dara-CyBorD (3-6コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラキマ投与終了後に投与 [H] ベルケイド 3mg (20)生食注 20mL	1.3mg	/m ² 1管	未定						
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント エトキシ 300mg/m ² (分1) day1・8・15・22 レデックス 40mg/日 day1・8・15・22 カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンルカスト 10mg(任意)をDARA1時間前に内服 70歳以上、BMI<18.5、コントロール不良の糖尿病などがある場合は、レデックス 20mg/日へ減量	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2022年06月10日 16時47分

レジメンNo. 01-040368

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Dara-CyBorD (3-6コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 30mLシリンジで払い出し [H] ダラキューロ皮下注15mL	15mL /Body	未定						
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラキューロ投与終了後に投与 [H] ペルケイド3mg (20)生食注 20mL	1.3mg /m ² 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

エンドキサン 300mg/m² (分1) day1・8・15・22 レテックス 40mg/日 day1・8・15・22
 カナール 700mg、ヒスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg (任意) をDARA1時間前に内服
 70歳以上、BMI < 18.5、コントロール不良の糖尿病などがある場合は、レテックス 20mg/日へ減量

マスタ内容確認シート

発行日時 2022年06月10日 16時47分

レジメンNo. 01-040368

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 **Dara-CyBorD (3-6コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ゲラキューロ投与終了後に投与 [H] ベルケイド 3mg (20)生食注 20mL	1.3mg /m ² 1管		未定						
	————— 終了 —————									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント エドキシブ 300mg/m ² (分1) day1・8・15・22 レダックス 40mg/日 day1・8・15・22 カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg(任意)をDARA1時間前に内服 70歳以上、BMI<18.5、コントロール不良の糖尿病などがある場合は、レダックス 20mg/日へ減量	医師	薬剤師