

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月23日 09時43分

レジメンNo. 01-070960

クール日数 9日 休薬期間 0日

レジメン名称 **MCVAC[移植前処置]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						未定
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋							未定
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 調製後は2時間以内に投与完了 30分で [H] サイメリン50mg (100)生食注100mL	250mg /m ² 100mL	未定						
04	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 調製後は2時間以内に投与完了 30分で [H] サイメリン50mg (100)生食注100mL	200mg /m ² 100mL							未定
05	点滴 点滴注射 ① 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋		未定	未定	未定	未定		
06	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) ① 3時間で [H] キロサイドN1g (500)生食500mL	2000mg /m ² 500mL		未定	未定	未定	未定		
07	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) ①シリンジポンプで持続投与 3時間で [H] ベプシド100mg (DI)	200mg /m ²		未定	未定	未定	未定		
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント ★心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-070960

クール日数 9日 休薬期間 0日

レジメン名称 **MCVAC[移植前処置]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
08	点滴 点滴注射 ①パプシドの側管から同時投与 3時間で (500)生食500mL	500mL		未定	未定	未定	未定		
09	点滴 点滴注射 ② 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋		未定	未定	未定	未定		
10	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) ② 3時間で [H] キロサイドN 1g (500)生食500mL	2000mg /m ² 500mL		未定	未定	未定	未定		
11	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) ②パプシドで持続投与 3時間で [H] ペプシド100mg (DI)	200mg /m ²		未定	未定	未定	未定		
12	点滴 点滴注射 ②パプシドの側管から同時投与 3時間で (500)生食500mL	500mL		未定	未定	未定	未定		
13	点滴 点滴注射【閉鎖系無菌加算(1)】 3時間で [H] エンドキサン500mg (500)生食500mL	50mg /kg 500mL							未定
14	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) CPA投与時 30分で ウロミテキサン注400mg (50)生理食塩液 50mL	20mg /kg 50mL							未定
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2021年04月23日 09時43分

レジメンNo. 01-070960

クール日数 9日 休薬期間 0日

レジメン名称 **MCVAC[移植前処置]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
15	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) CPA投与4時間後 30分で ウロミテキサン注400mg (50)生理食塩液 50mL	20mg 50mL	/kg								未定
16	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) CPA投与8時間後 30分で ウロミテキサン注400mg (50)生理食塩液 50mL	20mg 50mL	/kg								未定
17	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定	未定	未定	未定	未定	未定	未定	未定
----- 続きあり -----											

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント ★心電図モニター装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2021年04月23日 09時43分

レジメンNo. 01-070960

クール日数 9日 休薬期間 0日

レジメン名称 **MCVAC[移植前処置]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
13	点滴 点滴注射【閉鎖系無菌加算(1)】 3時間で [H] エンドキサン500mg (50)生食500mL	50mg 500mL /kg	未定						
14	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) CPA投与時 30分で ウロミテキサン注400mg (50)生理食塩液 50mL	20mg 50mL /kg	未定						
15	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) CPA投与4時間後 30分で ウロミテキサン注400mg (50)生理食塩液 50mL	20mg 50mL /kg	未定						
16	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) CPA投与8時間後 30分で ウロミテキサン注400mg (50)生理食塩液 50mL	20mg 50mL /kg	未定						
17	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

★心電図モニター装着